


Como tomar o seu



RESCRIPTOR

(Também chamado Delavirdine)

Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo ao Nucleosídeo (ITRN)


O que é o Rescriptor? (ruh-SKRIP-tor)

O Rescriptor é uma medicação forte que pode reduzir a quantidade de HIV no seu corpo. O Rescriptor combate o HIV melhor quando é tomado junto com uma ou mais medicações anti-HIV.


Quantos comprimidos eu devo tomar? E quando eu devo tomá-los?

Todo dia, tomar ____ comprimidos a cada ____ horas.


Tome seus comprimidos nesta hora TODOS OS DIAS:



De manhã



De tarde



*No início da
noite*

Importante: Para garantir que há sempre suficiente Rescriptor no seu corpo para combater o HIV, tome os seus comprimidos o mais próximo possível destes horários.

Instruções Especiais para tomar Rescriptor:

- Se você está tomando *antiácidos* (como TUMS ou Maalox), **NÃO** os tome no mesmo horário em que você tomar o Rescriptor. Tome o antiácido *pele menos uma hora antes* ou *uma hora após* você tomar Rescriptor.



- Se você está tomando *ddI*, **NÃO** o tome no mesmo horário em que você tomar o Rescriptor. Tome o DDI pelo menos *uma hora antes* ou *uma hora após* você tomar o Rescriptor.

O que fazer se eu esquecer de tomar meus comprimidos na hora certa?

- Quando você notar que você perdeu uma dose, tome o seu comprimido imediatamente.

Então, para a sua PRÓXIMA DOSE:

- Se o seu próximo horário planejado de tomar comprimidos for **quatro horas ou mais de distância**, tome a sua próxima dose no horário planejado.
- Se o seu próximo horário planejado de tomar comprimidos for **menos de quatro horas de distância**, **NÃO** tome sua próxima dose no horário planejado. Ao invés disso, espere quatro horas e então tome sua próxima dose.

Se você esquecer mais de duas doses em uma semana, ligue para o seu médico ou enfermeira para falar sobre o que fazer.




O que eu devo fazer se eu tiver efeitos colaterais?



Algumas pessoas que tomam Rescriptor tem efeitos colaterais (efeitos não desejados da medicação). O efeito colateral mais comum do Rescriptor é alergia de pele.

Se você tiver alergia de pele ou outros efeitos colaterais:

- Ligue para o seu médico ou enfermeira. Eles podem saber maneiras de aliviar os seus efeitos colaterais.
- NÃO tome menos comprimidos nem pare de tomar seus comprimidos. Fale com o seu médico primeiro.
- Tente as idéias na folha de dicas "lidando com efeitos colaterais".



Quais são as medicações que eu NÃO devo usar agora que eu estou tomando Rescriptor?

Algumas medicações não misturam bem com o Rescriptor. Tomar o Rescriptor quando você estiver usando estas medicações pode fazer você ficar muito doente ou fazer os remédios não funcionarem.



O seu médico sabe quais são as medicações seguras para tomar com o Rescriptor e quais não são. **Tenha certeza de que você tenha dito ao seu médico TODAS as medicações que você está tomando.** Isto inclui:

- Remédios receitados para você pelo seu médico
- Remédios que você pode comprar sem uma receita médica
- Ervas medicinais
- Drogas ilegais

Ligue para o seu médico ou enfermeira se:



- Você tem perguntas sobre como tomar Rescriptor
- Você está sendo incomodado pelos efeitos colaterais
- Você sente que precisa parar ou tomar menos Rescriptor
- Você está tendo problemas em tomar o Rescriptor na hora certa
- Você quer começar a tomar QUALQUER medicação que você não está tomando agora

NÃO ESQUEÇA: Você ainda pode espalhar o vírus.

As medicações anti-HIV que você está tomando podem ajudar você a ficar mais saudável por mais tempo. Mas elas não curam o HIV. Para evitar transmitir o HIV para os outros:

Pratique sexo seguro. Não compartilhe agulhas ou seringas.

*Desenvolvido por John Snow, Inc. e JSI Pesquisa Clínica. Boston, MA, 1998; atualizado em 2001.
Este documento pode ser reproduzido para propósitos educacionais, se usado inteiramente e dado crédito apropriado.*