

Cómo tomar su



FORTOVASE

(También llamado Saquinavir)


¿Qué es Fortovase?

Fortovase es una medicina fuerte que puede reducir la cantidad de HIV en su cuerpo. Fortovase combate el HIV mejor cuando lo toma junto con una u otras más medicinas contra el HIV.


¿Cuántas pastillas tomo? ¿Y cuándo las tomo?

Cada día tome _____ pastillas cada _____ horas.


Tome sus pastillas a estas horas CADA DÍA:



Mañana



Tarde




Noche

Importante: Para estar seguro de que haya siempre suficiente Fortovase en su cuerpo para combatir el HIV, tome sus pastillas tan cerca de estas horas como sea posible. Y asegúrese de tomar el número correcto de pastillas cada vez.

Instrucciones especiales para tomar el Fortovase

- Tome sus pastillas mientras come su comida o bocadillo. Su cuerpo absorbe el Fortovase mejor cuando tiene comida en el estómago.



¿Qué hago si se me olvida tomar mis pastillas a la hora indicada?

- Cuando usted note que se le ha olvidado una dosis, tome sus pastillas inmediatamente.

Luego, para la siguiente dosis:

- Si faltan cuatro horas o más para la hora de tomar la siguiente dosis, tómela a esa misma hora como está indicada según su plan.



- Si faltan menos de cuatro horas para la hora de tomar la siguiente dosis, NO la tome a la hora como está indicada según el plan. Mejor espere cuatro horas para después tomar la dosis siguiente.

Si olvida más de dos dosis en una semana, llame a su doctor o enfermera para hablar acerca de lo que hay que hacer.

¿Qué debo hacer si tengo efectos secundarios?



Algunas personas que toman Fortovase tienen efectos secundarios (efectos no deseados de la medicina). Posibles efectos secundarios pueden ser:

- diarrea
- sentirse mal del estómago
- sentirse “lleno de gases”

Si usted tiene estos u otros efectos secundarios:

- Tenga presente que la mayoría de los efectos secundarios desaparecen en unos pocos días o semanas.
- Llame a su doctor o enfermera. Ellos pueden tener maneras de aliviarlo de sus efectos secundarios.
- No tome menos o deje de tomar sus pastillas. Hable con su doctor primero.
- Pruebe las ideas en la hoja de información, "*Haciendo Frente a los Efectos Secundarios.*"

Importante: Algunos posibles efectos secundarios de Fortovase pueden ser descubiertos en pruebas de laboratorio hechos por un doctor o enfermera. Asegúrese de ir a todas las citas con su doctor.



¿Cuáles son las medicinas que no debo usar ahora que estoy tomando Fortovase?

Algunas medicinas no se mezclan bien con el Fortovase. Tomar Fortovase cuando está usando estas medicinas pueden enfermarlo mucho o causar que las medicinas no sean eficaces .



Su doctor sabe cuáles medicinas son seguras de tomar con Fortovase y cuáles no lo son. **Asegúrese de que le ha dicho a su doctor acerca de todas las medicinas que usted está tomando.** Esto incluye:

- medicinas que le ha recetado un doctor
- medicinas que puede comprar sin receta médica
- hierbas medicinales
- drogas de la calle

Llame a su doctor o enfermera si:

- tiene preguntas acerca de cómo tomar Fortovase
- le molestan los efectos secundarios
- siente que quiere dejar de tomar o tomar menos Fortovase
- tiene problema para tomar Fortovase a la hora indicada
- quiere comenzar a tomar CUALQUIER medicina que no está tomando ahora.



NO OLVIDE:

Usted todavía puede transmitir el virus.

Las medicinas contra el virus de HIV que usted está tomando pueden ayudarle a permanecer más saludable por más largo tiempo.

Pero no curan el HIV. Para evitar pasarle el virus del HIV a otros: Tenga relaciones sexuales con precaución. No comparta agujas ni jeringas.

Desarrollado por John Snow, Inc. y Clinical Research, Boston, MA, 1998.

Este documento puede ser reproducido para usarse en su totalidad con propósitos educacionales, siempre y cuando se reconozca al autor apropiadamente.

