

Cómo tomar su



RESCRIPTOR

(También llamado delavirdine)


¿Qué es Rescriptor?

Rescriptor es una medicina fuerte que puede reducir la cantidad de HIV en su cuerpo. Rescriptor combate el HIV mejor cuando lo toma junto con una u otras más medicinas contra el HIV.


¿Cuántas pastillas tomo? ¿Y cuándo las tomo?

Cada día tome _____ pastillas cada _____ horas.


Tome sus pastillas a estas horas cada día:



Mañana



Tarde



Noche

Importante: Para estar seguro de que haya siempre suficiente Rescriptor en su cuerpo para combatir el HIV, tome sus pastillas tan cerca de estas horas como sea posible. Y asegúrese de tomar el número correcto de pastillas cada vez.

Instrucciones especiales para tomar el Rescriptor:

- Tome un vaso de jugo de naranja o de Coca-cola cuando tome sus pastillas. Esto ayudará a su cuerpo a absorber mejor el Rescriptor.



- Si está tomando un **antiácido** (tal como Tums o Maalox), NO lo tome al mismo tiempo que usted toma Rescriptor. Tome el antiácido **por lo menos una hora antes** o **una hora después de tomar Rescriptor**.
- Si usted está tomando **ddl**, no lo tome al mismo tiempo que Rescriptor. Tome ddl por menos **una hora antes** o **una hora después de tomar Rescriptor**.

¿Qué hago si se me olvida tomar mis pastillas a la hora indicada?

- Cuando usted note que ha olvidado una dosis, tome sus pastillas inmediatamente.

Luego, para su SIGUIENTE DOSIS:

- Si faltan cuatro horas o más para la hora de tomar la siguiente dosis, tómela a esa misma hora como está indicada según su plan.
- Si faltan menos de cuatro horas para la hora de tomar la siguiente dosis, NO la tome a la hora como está indicada según el plan. Mejor espere cuatro horas para después tomar la dosis siguiente.

Si olvida más de dos dosis en una semana, llame a su doctor o enfermera para hablar acerca de lo que hay que hacer.




¿Qué debo hacer si tengo efectos secundarios?



Algunas personas que toman Rescriptor tienen efectos secundarios (efectos no deseados de la medicina). El efecto secundario más común del Rescriptor es sarpullido o ronchas.

Si tiene sarpullido u otro efecto secundario:

- Llame a su doctor o enfermera. Ellos pueden tener maneras de aliviarlo de sus efectos secundarios.
- No tome menos o deje de tomar sus pastillas. Hable con su doctor primero.
- Pruebe las ideas de su hoja de información, “*Haciendo Frente a los Efectos Secundarios*”



¿Cuáles son las medicinas que no debo usar ahora que estoy tomando Rescriptor?

Algunas medicinas no se mezclan bien con Rescriptor. Tomar Rescriptor cuando esté usando estas medicinas puede enfermarlo mucho o causar que las medicinas no sean eficaces.



Su doctor sabe cuáles medicinas son seguras de tomar con Rescriptor y cuáles no lo son. **Asegúrese de haberle dicho a su doctor acerca de TODAS las medicinas que está tomando.**

Esto incluye:

- medicinas que le ha recetado un doctor
- medicinas que puede comprar sin receta médica
- hierbas medicinales
- drogas de la calle

Llame a su doctor o enfermera si:

- tiene preguntas acerca de cómo tomar Rescriptor
- le molestan los efectos secundarios
- siente que quiere dejar de tomar o tomar menos Rescriptor
- tiene problema para tomar Rescriptor a la hora indicada
- quiere comenzar a tomar CUALQUIER medicina que no está tomando ahora.



NO OLVIDE:

Usted todavía puede transmitir el virus.

Las medicinas contra el virus de HIV que usted está tomando pueden ayudarle a permanecer más saludable por más largo tiempo.

Pero no curan el HIV. Para evitar pasarle el virus del HIV a otros: Tenga relaciones sexuales con precaución. No comparta agujas ni jeringas.

Desarrollado por John Snow, Inc. y Clinical Research, Boston, MA, 1998.

Este documento puede ser reproducido para usarse en su totalidad con propósitos educativos, siempre y cuando se reconozca al autor apropiadamente.

